


2013. 3.14 アルゴリズム開発  
2014. 2.12 keisanに資料UP

## 一般橢円体の部分表面積を数値積分で求める



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

帯領域の表面積	$S_{\text{band}}$	0	$z$	$h_b$	$c$
帽子領域の表面積	$S_{\text{cap}}$	0	$c-h_c$	$z$	$c$


Gauss-Chebyshev integration

$$I = \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

$$w_i = \frac{\pi}{n}, \quad x_i = \cos\left(\frac{2i-1}{2n}\pi\right)$$

- 1)複素数計算により、a,b,cの大きさに制限なく求める
- 2)  $h_c, h_b$  が微小値でも  $S_{\text{cap}}, S_{\text{band}}$  の精度を確保する (keisan上の演算のみ有効)
- 3)Gauss-Chebyshev積分を利用する(分点、重みの計算が容易)

## 橢円体の冠部の表面積を数値積分で求める



$$\begin{aligned}
 &= \int_{\theta=\cos^{-1}h}^{\frac{\pi}{2}} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \sqrt{b^2c^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + c^2a^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + a^2b^2 \cos^2 \theta} \sin \theta d\theta d\varphi \\
 &= 4bc \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{B} \int_{u=0}^h \sqrt{1+Fu^2} du d\varphi \\
 &= 2bc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{B} \left| u \sqrt{1+Fu^2} + \frac{1}{\sqrt{F}} \sinh^{-1}(\sqrt{F}u) \right|_0^h d\varphi \\
 &= 2bch \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{B} \left( \sqrt{1+Fh^2} + \frac{\sinh^{-1}(\sqrt{F}h)}{\sqrt{F}h} \right) d\varphi \\
 &= bch \int_{-1}^1 \sqrt{B(t)} \left( \sqrt{1+F(t)h^2} + \frac{\sinh^{-1}(h\sqrt{F(t)})}{h\sqrt{F(t)}} \right) \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\
 &= bch \sum_{i=1}^n \frac{\pi}{n} f\left(\cos\left(\frac{2i-1}{2n}\pi\right)\right)
 \end{aligned}$$

### Gauss-Chebyshev integration

$$S = bch \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = bch \sum_{i=1}^n w_i f(x_i) \quad w_i = \frac{\pi}{n}, \quad x_i = \cos\left(\frac{2i-1}{2n}\pi\right)$$

$$\begin{aligned}
 x &= a \sin \theta \cos \varphi \\
 y &= b \sin \theta \sin \varphi \\
 z &= c \cos \theta
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{r} = a \sin \theta \cos \varphi \mathbf{i} + b \sin \theta \sin \varphi \mathbf{j} + c \cos \theta \mathbf{k}$$

$$\begin{aligned}
 d\mathbf{S} &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} d\theta \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} d\varphi = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \varphi & b \cos \theta \sin \varphi & -c \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \varphi & b \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{vmatrix} d\theta d\varphi \\
 &= (bc \sin \theta \cos \varphi \mathbf{i} + ca \sin \theta \sin \varphi \mathbf{j} + ab \cos \theta \mathbf{k}) \sin \theta d\theta d\varphi
 \end{aligned}$$

$$dS = |d\mathbf{S}| = \sqrt{b^2 c^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + c^2 a^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + a^2 b^2 \cos^2 \theta} \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$u = \cos \theta, \quad du = -\sin \theta d\theta, \quad h = \frac{h_b}{c}$$

$$B = \cos^2 \varphi + \frac{a^2}{b^2} \sin^2 \varphi = 1 - \left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right) \sin^2 \varphi, \quad F = \frac{a^2}{c^2} \frac{1}{B} - 1$$

$$\int \sqrt{1+ax^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{1+ax^2} + \frac{1}{2\sqrt{a}} \sinh^{-1}(\sqrt{a}x)$$


$$t = \sin \varphi, \quad d\varphi = \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$B(t) = 1 - \left(1 - \frac{a^2}{b^2}\right) t^2, \quad F(t) = \frac{a^2}{c^2} \frac{1}{B(t)} - 1$$

$$f(t) = \sqrt{B(t)} \left( \sqrt{1+F(t)h^2} + \frac{\sinh^{-1}(h\sqrt{F(t)})}{h\sqrt{F(t)}} \right)$$

$$F(t) = 0 \Rightarrow f(t) = 2h \frac{a}{c}$$

## 橢円体の帽子部の表面積を数値積分で求める



$$\begin{aligned} &= \int_{\theta=0}^{\cos^{-1} h} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \sqrt{b^2 c^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + c^2 a^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + a^2 b^2 \cos^2 \theta} \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= 4bc \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{B} \int_{u=h}^1 \sqrt{1+Fu^2} du d\varphi \\ &= 2bc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{B} \left| u \sqrt{1+Fu^2} + \frac{1}{\sqrt{F}} \sinh^{-1}(\sqrt{Fu}) \right|_h^1 d\varphi \\ &= 2bc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{B} \left\{ \sqrt{1+F} - h\sqrt{1+Fh^2} + \frac{1}{\sqrt{F}} (\sinh^{-1}(\sqrt{F}) - \sinh^{-1}(h\sqrt{F})) \right\} d\varphi \\ &= 2bc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{B} \left\{ \sqrt{1+F} - h\sqrt{1+Fh^2} + \frac{1}{\sqrt{F}} \sinh^{-1} \left( \sqrt{F} \left( \sqrt{1+Fh^2} - h\sqrt{1+F} \right) \right) \right\} d\varphi \\ &= ab \int_{-1}^1 \left\{ 1 - hG(t) + \frac{c}{a} \sqrt{\frac{B}{F}} \sinh^{-1} \left( \frac{a}{c} \sqrt{\frac{F}{B}} (G(t) - h) \right) \right\} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\ &= ab \int_{-1}^1 \left\{ 1 - hG(t) + (G(t) - h) - \frac{\sinh^{-1} \left( \frac{a}{c} \sqrt{\frac{F}{B}} (G(t) - h) \right)}{\frac{a}{c} \sqrt{\frac{F}{B}} (G(t) - h)} \right\} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\ &= ab \sum_{i=1}^n \frac{\pi}{n} f \left( \cos \left( \frac{2i-1}{2n} \pi \right) \right) \end{aligned}$$

$$x = a \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = b \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = c \cos \theta$$

$$\mathbf{r} = a \sin \theta \cos \varphi \mathbf{i} + b \sin \theta \sin \varphi \mathbf{j} + c \cos \theta \mathbf{k}$$

$$d\mathbf{S} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} d\theta \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} d\varphi = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \varphi & b \cos \theta \sin \varphi & -c \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \varphi & b \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{vmatrix} d\theta d\varphi$$

$$dS = |d\mathbf{S}| = \sqrt{b^2 c^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + c^2 a^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + a^2 b^2 \cos^2 \theta} \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$u = \cos \theta, \quad du = -\sin \theta d\theta \quad h = 1 - \frac{h_c}{c}$$

$$B = \cos^2 \varphi + \frac{a^2}{b^2} \sin^2 \varphi = 1 - \left( 1 - \frac{a^2}{b^2} \right) \sin^2 \varphi, \quad F = \frac{a^2}{c^2} \frac{1}{B} - 1$$

$$\int \sqrt{1+ax^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{1+ax^2} + \frac{1}{2\sqrt{a}} \sinh^{-1}(\sqrt{a}x)$$

$$\sinh^{-1} x - \sinh^{-1} y = \sinh^{-1} \left( x\sqrt{1+y^2} - y\sqrt{1+x^2} \right)$$

$$t = \sin \varphi, \quad d\varphi = \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \quad B(t) = 1 - \left( 1 - \frac{a^2}{b^2} \right) t^2, \quad F(t) = \frac{a^2}{c^2} \frac{1}{B(t)} - 1$$

$$G(t) = \sqrt{h^2 + (1-h^2) \frac{c^2}{a^2} B(t)}$$

$$f(t) = 1 - hG(t) + \frac{c}{a} \sqrt{\frac{B}{F}} \sinh^{-1} \left( \frac{a}{c} \sqrt{\frac{F}{B}} (G(t) - h) \right)$$

$$F(t) = 0 \Rightarrow f(t) = 2(1-h)$$

### Gauss-Chebyshev integration

$$S = ab \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = ab \sum_{i=1}^n w_i f(x_i) \quad w_i = \frac{\pi}{n}, \quad x_i = \cos \left( \frac{2i-1}{2n} \pi \right)$$